




MONILIASIS (*Moniliophthora roreri*)



El hongo solo afecta frutos, su ciclo comienza con la estación seca, pero se requiere humedad para que inicie la infección.

Condiciones que favorecen:

Altas temperaturas, precipitaciones y humedad relativa, exceso de sombra.

Diseminación:

Esporas por el viento durante la esporulación, lluvia, insectos y el hombre.





SÍNTOMAS DE MONILIASIS



Abultamientos cloróticos



Giba



SÍNTOMAS DE MONILIASIS



Presencia de micelio



Momificados/esporulación



SÍNTOMAS DE MONILIASIS



Maduración precoz



Puntos aceitosos



Mancha chocolate



MANEJO DE LA ENFERMEDAD

- ❖ Cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de salud agrícola integral, que prohíbe el traslado de material y plantas de cacao de las zonas afectadas a zonas libres de la enfermedad.
- ❖ Mantener la altura de las plantas a 3.5 m.
- ❖ Ralear sombrío excesivo, hacer podas de mantenimiento (durante el período seco) drenajes limpios y control de malezas.
- ❖ Inspecciones periódicas a la plantación para recolectar los frutos enfermos (semanalmente) en contenedores y aplicar urea o cal agrícola.